

MAXIDINA® Food Rapid

kód artiklu: A27001-2

TECHNICKÝ LIST**• VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU A OBLAST JEHO POUŽITÍ**

Přípravek Maxidina® Food Rapid je určen k řešení problémů souvisejících s nepříjemným zápachem vznikajícím v malých a středně velkých provozovnách určených ke zpracování zemědělských produktů, jako jsou sýrárny, olejárny, rybárny, řeznictví, prodejny ovoce a zeleniny a v jiných potravinářských provozovnách obecně. Maxidina® Food Rapid po jednom použití vyčistí a odmastí pracovní pulty, nástroje, podlahu, obklady na stěnách a jiný tvrdý povrchy obecně, čímž na dlouhou dobu odstraní nepříjemný zápach. Dále jej lze použít k vyčištění podlahových odtoků ve shora uvedených provozovnách. Maxidina® Food Rapid je jediným existujícím produktem, který dokáže rychle odstranit nepříjemný zápach a zefektivnit tak vynaloženou práci. Navíc rozkládá biofilm, ve kterém se mohou různé mikroorganismy zachytit, čímž zabrání a předejde mikrobiální kontaminaci (bakteriální a virové) a veškerý povrch účinně vyčistí, jak vyžadují příslušné předpisy na celostátní úrovni, vydané Ministerstvem zdravotnictví, nebo na mezinárodní úrovni, vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Maxidina® Food Rapid působí kontaktně a neobsahuje chlór, enzymy ani žádné jiné agresivní látky.

• NÁVOD K POUŽITÍ

1 sáček přípravku Maxidina® Food Rapid vložte přímo do přiloženého dávkovače a přidejte čistou vodou až do max. 8 l. Sáček neotvírejte, protože je snadno rozpustný ve vodě. Nádobu zavřete a dávkovač natlakujte, abyste dosáhli vodní mlhy k použití na ošetřovaný povrch. Aplikovaný roztok není třeba oplachovat.

Přípravek Maxidina® Food Rapid nemíchejte s jinými přípravky.

• MANIPULACE A USKLADNĚNÍ

Nikdy se sáček nedotýkejte mokřými rukavicemi nebo rukama! Obal nerozřezávejte, abyste mohli přípravek vylít, sáček je totiž snadno rozpustný ve vodě.

Výrobek skladujte v původním obalu, na suchém místě a mimo dosah dětí a přímého slunečního světla.

• SLOŽENÍ

Přípravek mimo jiné obsahuje: 30 % a více peroxodisíranu draselného (5 % aktivního kyslíku), 15 % i více, ale méně než 30 %, aniontových povrchově aktivních látek a hydrogenuhličitan sodný.

Balení obsahuje vysoušecí granule silikagelu.

• DOBA SKLADOVÁNÍ

5 let při skladování na suchém místě chráněném před zdroji tepla a světla.

• UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí 

Obsahuje peroxodisíran draselný. Při požití je škodlivý. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže. Vyhněte se vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice. Chraňte si oči a obličej.

Při vdechnutí vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu a poloze, která je pro dýchání pohodlná. Pokud se necítíte dobře, kontaktujte toxikologické centrum nebo lékaře. V případě podráždění kůže nebo vyrážky vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékaře. V případě respiračních příznaků, zavolejte toxikologické centrum nebo lékaře. Výrobek a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Toxikologické středisko: 224 919 293.

Upozornění se týkají koncentrovaného produktu v prášku.