

MAXIDINA® Horeca
kód artiklu: A24001-2-3**TECHNICKÝ LIST****• VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU A OBLAST JEHO POUŽITÍ**

Přípravek Maxidina® Horeca je určen ke každodennímu čištění pracovních ploch, chladniček, chladicích boxů, sporáků, talířů, nádobí a nádob na odpad v gastronomických provozech, restauracích, barech, hotelech a ubytovacích zařízeních obecně. Přípravek je vhodný i k odstranění nepříjemného zápachu uvnitř provozoven s potravinami, jako jsou např. rybárny, řeznictví atd. Používá se jako běžný čisticí prostředek a je jediným existujícím produktem na trhu, který dokáže rychle odstranit nepříjemný zápach organického původu a zefektivnit tak vynaloženou práci. Navíc rozkládá biofilm, ve kterém se mohou různé mikroorganismy zachytit, čímž zabrání a předejde mikrobiální kontaminaci (bakteriální a virové) a veškerý povrch účinně vyčistí, jak vyžadují příslušné předpisy na celostátní úrovni, vydané Ministerstvem zdravotnictví, nebo na mezinárodní úrovni, vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Maxidina® Horeca neobsahuje chlór, enzymy, parfémové složky ani žádné jiné škodlivé látky, působí rychle a radikálně řeší problémy související s nepříjemným zápachem.

• NÁVOD K POUŽITÍ

1 5g sáček přípravku Maxidina® Horeca vložte přímo dávkovače a přidejte čistou vodu. Sáček neotvírejte, protože je snadno rozpustný ve vodě. Vyčkejte několik minut, než se sáček rozpustí a produkt bude připraven k použití na ošetřovaný povrch. Nanesený přípravek není třeba oplachovat. Roztok lze použít v následujících 20 dnech. Poté jej doporučujeme vylít do odpadu a připravit nový.

Přípravek Maxidina® Horeca nemíchejte s jinými přípravky.

• MANIPULACE A USKLADNĚNÍ

Nikdy se sáčků nedotýkejte mokřými rukavicemi nebo rukama! Obal nerozřezávejte, abyste mohli přípravek vylít, sáček je totiž snadno rozpustný ve vodě.

Výrobek skladujte v původním obalu, na suchém místě a mimo dosah dětí a přímého slunečního světla.

• SLOŽENÍ

Přípravek mimo jiné obsahuje: 30 % a více peroxodisíranu draselného (5 % aktivního kyslíku), 15 % i více, ale méně než 30 %, aniontových povrchově aktivních látek a hydrogenuhličitan sodný.

Balení obsahuje vysušecí granule silikagelu.

• DOBA SKLADOVÁNÍ

5 let při skladování na suchém místě chráněném před zdroji tepla a světla.

• UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí 

Obsahuje peroxodisíran draselný. Při požití je škodlivý. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže. Vyhněte se vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice. Chraňte si oči a obličej.

Při vdechnutí vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu a poloze, která je pro dýchání pohodlná. Pokud se necítíte dobře, kontaktujte toxikologické centrum nebo lékaře. V případě podráždění kůže nebo vyrážky vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékaře. V případě respiračních příznaků, zavolejte toxikologické centrum nebo lékaře. Výrobek a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Toxikologické středisko: 224 919 293.

Upozornění se týkají koncentrovaného produktu v prášku.